

1] Integration around unit Circles:-

$$I = \int_0^{2\pi} F(\sin \theta, \cos \theta) d\theta$$

في هذا الجزء نحاول الاستفادة من قواعد تكامل الدوال المركبة بأن نحول بعض العصور القياسية إلى تكاملات يمكن حسابها بقواعد الدوال المركبة وعكس هذه التحويلة لمعرفة التكامل المبسط.

الحالة الأولى:- تكاملات جذورها $(0 \rightarrow 2\pi)$ وتحتوي على دوال مثلثية فقط.

الفكرة

في الحدود $(0 \rightarrow 2\pi)$ أنها إذا كانت دائرة تكون قد لفت ~~لغة~~ كاملة فيمكن الدخول للفكرة من هذا المنظور.

$$|z| = 1 \quad z = e^{i\theta} \quad \frac{1}{z} = e^{-i\theta}$$

$$z = \cos \theta + i \sin \theta \rightarrow (1)$$

$$\frac{1}{z} = \cos \theta - i \sin \theta \rightarrow (2)$$

بجمع (1) و (2)

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \\ \sin \theta &= \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) \end{aligned} \rightarrow *$$

$$z = e^{i\theta} \rightarrow dz = i e^{i\theta} d\theta$$

$$\boxed{d\theta = \frac{dz}{iz}} \rightarrow (**)$$

← بتعريفنا من $(*, **)$ في أي تكامل به $\cos \theta$, $\sin \theta$ وحدوده $(0 \leftarrow 2\pi)$ تحول المسألة إلى $\int_{|z|=1} f(z) dz$ بحسب بقاؤه الـ (Complex).

Ex Evaluate $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{z + \sin \theta}$

Sol

← تحول التكامل إلى "Complex".

$$\sin \theta = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) ; d\theta = \frac{dz}{iz} ; |z| = 1$$

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{dz}{iz}}{z + \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right)} = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{2iz + \frac{1}{2} z^2 - \frac{1}{2}}$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{z^2 + 4iz - 1}$$

$$\text{Roots} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4i \pm \sqrt{-16 + 4}}{2}$$

$$Z_0 = -2i + \sqrt{3}i$$

$$Z_1 = -2i - \sqrt{3}i$$

$$Z_0 = (-2 + \sqrt{3})i$$

$$Z_1 = (-2 - \sqrt{3})i$$

$$|Z_0| = \sqrt{0^2 + (-2 + \sqrt{3})^2} = 1$$

$$Z_1 = \sqrt{0^2 + (-2 - \sqrt{3})^2} = 1$$

$$Z_0 = \sqrt{3} - 2 < 1$$

$$Z_1 = 2 + \sqrt{3} > 1$$

تقع خارج الدائرة

تقع داخل الدائرة

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{2dz}{(z-z_1)(z-z_0)} = 2\pi i \left(\frac{2}{Z_0 - Z_1} \right) = \frac{4\pi i}{2\sqrt{3}i} = \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{3}}}$$

* الأفكار :-

١- عندما تكون زاوية الدوال n كما يظهر في المسألة $\cos n\theta$ و $\sin n\theta$ والحدود من 0 إلى 2π

$$|z|=1 \Rightarrow z = e^{i\theta}$$

$$z^n = e^{in\theta}, \quad z^{-n} = e^{-in\theta}$$

$$z^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

$$z^{-n} = \cos(n\theta) - i \sin(n\theta)$$


$$\cos(n\theta) = \frac{1}{2} \left(z^n + \frac{1}{z^n} \right), \quad \sin(n\theta) = \frac{1}{2i} \left(z^n - \frac{1}{z^n} \right)$$

$$d\theta = \frac{dz}{iz}$$

٢- إذا كانت الحدود من -2π إلى 2π

لا بد أن يكون الدالة داخل التكامل زوجية.

$$F(-\theta) = F(\theta)$$




ويكون

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} F(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = 2 \int_0^{2\pi} \dots$$


even

$$F(-x) = +F(x)$$



odd

$$-F(x) = F(-x)$$



مع ولا بد أن ننظر على أساس الـ

(sine) ولا بد أن تكون أساس الـ (sine)



زوجية

٣- إذا كانت حدود الدالة من ٥ إلى π

$$F(x+2T) = F(x)$$

$$F(x+T) = F(x)$$


(even harmonic)



$$F(x+2T) = F(x)$$

$$F(x+T) = -F(x)$$

(odd harmonic)



إذا كانت حدود التكامل من 0 إلى π فإن:

$$\int_0^{2\pi} f(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = \begin{cases} 2 \int_0^{\pi} f(\sin \theta, \cos \theta) d\theta \\ 0 & f(\theta + \pi) = f(\theta) \\ 0 & f(\theta + \pi) = -f(\theta) \end{cases}$$

$$\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta \quad ; \quad \cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$$

$$\int_0^{\pi} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \quad * \quad \leftarrow \text{إذا كانت جميع أسس } \sin \theta, \cos \theta \text{ زوجية.}$$

أو مجموع الأسس في الحدود المفردة زوجي $(\sin \theta \cos^3 \theta)$

Ex Evaluate $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 3\theta}{1 - \cos \theta} d\theta$

Solution

$$\text{use: } |z|=1 \Rightarrow \cos 3\theta = \frac{1}{2} \left(z^3 + \frac{1}{z^3} \right), \cos \theta = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

$$d\theta = \frac{dz}{iz} \quad \therefore I = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{1}{2} \left(z^3 + \frac{1}{z^3} \right)}{1 - \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)} * \frac{dz}{iz}$$

$$I = i \oint_{|z|=1} \frac{(z^6 + 1)}{z^3 (z^2 - 2z + 1)} dz$$

$$I = i \oint_{|z|=1} \frac{(z^6 + 1)}{(z-0)^3 (z-1)^2} dz$$

$z=0 \rightarrow$ is pole ~~of~~ of order 3.

$$\text{Res } f(z) = \frac{1}{2i} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} (z-0)^3 \frac{z^6 + 1}{z^3 (z-1)^2}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \frac{(z-1)^2 \times 6z^5 - (z^6 + 1) \times 2(z-1)}{(z-1)^4} = \alpha$$

$$\text{Res } f(z) = \frac{1}{1} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} (z-1)^2 \frac{z^6 + 1}{z^3 (z-1)^2} = \beta$$

$$I = 2\pi i [\alpha + \beta]$$

[2] Integration of form $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$


where: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$

$$\deg[Q(x)] \geq \deg[P(x)] + 2$$

بشرط أن لا تقع على محور x

why?

$$C = C_R \cup [-R, R]$$



$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz$$

→ أسلوب التفكير

→ نحاول تكوين منطقة جذورها منحني هذا المنحنى جزء منه يعطى رأس المسألة ويمكن حساب تكامل للدوال المركبة عليه.

$$I = \underbrace{I_1}_{\substack{\text{يعطى الرأس} \\ R \rightarrow \infty}} + \underbrace{I_2}_{\substack{\int_{C_R} f(z) dz \\ \text{بحسب بقواعد} \\ \text{Complex}}}$$

→ نستخدم خواص المقياس:


$$|z_1| - |z_2| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

→ لكن نثبت أنه وفّر عند $(R \rightarrow \infty)$ لأن درجة المقام أعلى من درجة البسط ونستخدم:

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |f(z)| |dz|$$

Example Evaluate $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$

→ درجة المقام أعلى من درجة البسط في z ~~فنستخدم~~ فنستخدم:



$$\therefore z^4 + 1 = 0 \Rightarrow z = (-1)^{\frac{1}{4}}$$

أضرب المقام

$$(x+iy)^{\frac{1}{n}} = r^{\frac{1}{n}} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2K\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2K\pi}{n} \right) \right]$$

$$x = -1, y = 0 \Rightarrow r = 1 \quad (\theta = \tan^{-1} \frac{0}{-1} = \pi)$$

$$(-1)^{\frac{1}{4}} = \cos \left(\frac{\pi + 2K\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi + 2K\pi}{4} \right), \quad K = 0, 1, 2, \dots$$

$$K=0 \Rightarrow Z_0 = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$K=1 \Rightarrow Z_1 = \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{-1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}$$

$$Z_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}, \quad Z_3 = \frac{-1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}$$

← لا بد من جد على صفر

$$f(z) = \frac{1}{(z-z_0)(z-z_1)(z-z_2)(z-z_3)}$$

$$\oint_C \frac{dz}{z^4+1} = \int_{-R}^R \frac{dx}{x^4+1} + \int_{C_R} \frac{dz}{z^4+1}$$

$$I = I_1 + I_2, \quad I = \oint_C \frac{dz}{z^4+1}$$

Contour $\leftarrow Z_1, Z_0$ ←

$\leftarrow Z_3, Z_2$ ← نصف المنحنى

$$\text{Res } f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{1}{(z - z_0)(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)}$$

$$= \frac{1}{(z_0 - z_1)(z_0 - z_2)(z_0 - z_3)} = \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{2i}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{2i}{\sqrt{2}}\right)}$$

$$\text{Res } f(z) = \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) \frac{1}{(z - z_0)(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)}$$

$$= \frac{1}{(z_1 - z_0)(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)} = \frac{1}{\left(\frac{-2}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{-2}{\sqrt{2}} + \frac{2i}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{2i}{\sqrt{2}}\right)}$$

$$I = 2\pi i \left(\text{Res } f(z)_{z=z_0} + \text{Res } f(z)_{z=z_1} \right)$$

as $R \rightarrow \infty$

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}, \quad I_2 = \int_{C_R} \frac{dz}{z^4 + 1}$$

من إثبات أن هذا التكامل = صفر أنه لن نصل إلى 0 $|I_2| \leq 0$
ولا يوجد مقياس بالسالب فلا بد أن يكون التكامل صفر.

الخطوات (1) أنه فوزع المقياس داخل التكامل.

(2) أنه نحافظ على أقل منه ($<$)

(3) ~~لو~~ لو إشارة فوقه موجب نخليها سالبة وإذا كانت سالبة نخليها موجب • حتى تكون الكمية محافظة على علاقة أقل منه ($<$)


$$|I_2| \leq \int_{C_R} \frac{|dz|}{z^4 + 1} \leq \int_{C_R} \frac{|dz|}{|z|^4 - 1}$$

$$|z| = R \Rightarrow z = R e^{i\theta} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$dz = i R e^{i\theta} d\theta$$

$$|dz| = \underbrace{|i|}_{1} \underbrace{|R|}_{1} \underbrace{|e^{i\theta}|}_{1} d\theta$$

$$|dz| = R d\theta$$



$$I_2 \leq \int_0^\pi \frac{R d\theta}{R^4 - 1} \quad \text{~~then as } R \rightarrow \infty~~$$

$$R \rightarrow \infty \Rightarrow \int_0^\pi \frac{R}{R^4 - 1} d\theta \rightarrow 0$$

$$I_2 \leq 0 \Rightarrow I_2 = 0$$

$$I_1 = I \bullet = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = 2\pi i \left(\text{Res}_{z=z_0} + \text{Res}_{z=z_1} \right)$$